

### AUTOEVALUACIÓN TEMA 13

En el paciente obeso la causa mas frecuente de hipoxemia postoperatoria es:

- A. Embolismo pulmonar
- B. Embolismo grado
- C. Disminución capacidad residual funcional
- D. Broncoespasmo

Que fármaco antagoniza la naloxona:

- A. Tiopental Sódico
- B. Propofol
- C. Fentanilo
- D. Atracurio

Con que situación clínica relaciona el haloperidol:

- A. Infección
- B. Dolor
- C. Agitación
- D. Hemorragia

Con que situación clínica relaciona la meperidina:

- A. Arritmia
- B. Dolor
- C. Agitación
- D. Hemorragia

Con que situación clínica relaciona la metoclopramida:

- A. Infección
- B. Dolor
- C. Vómitos
- D. Hemorragia

Con que fármaco relaciona el tratamiento de los escalofríos postquirúrgicos:

- A. Haloperidol
- B. Meperidina
- C. Neostigmina
- D. Flumazenilo

Con que fármaco trataría la sedación residual por benzodiazepinas:

- A. Haloperidol
- B. Meperidina
- C. Neostigmina
- D. Flumazenilo

Cuales de las siguientes afirmaciones relaciona con la insuficiencia renal aguda prerrenal:

- A. Osmolalidad > 400 mOs/Kg
- B. Na orina > 40 mEq/L
- C. Oliguria
- D. Incremento creatinemia