

AUTOEVALUACIÓN TEMA 15

Cual de estos opioides es agonista parcial:

- A. Oxycodona
- B. Morfina
- C. Buprenorfina
- D. Fentanilo

Cual de estos opioides es antagonista:

- E. Oxycodona
- F. Naloxona
- G. Buprenorfina
- H. Naltrexona

Señale la/as cierta/as. La morfina produce:

- A. Hipertensión
- B. Euforia
- C. Diarrea
- D. Analgesia

Señale la/as cierta/as. La morfina produce:

- E. Hipercapnia
- F. Hipotermia
- G. Náuseas
- H. Escalofríos

En que cuadro doloroso no se recomienda morfina:

- A. Angor
- B. Fractura de fémur
- C. Cólico hepático (biliar)
- D. Postoperatorio con dolor intenso

Señale cuales son opioides menores:

- A. Fentanilo
- B. Codeína
- C. Dihidrocodeína
- D. Tramadol

Cual/es de estos opioides se administra por vía transcutánea:

- A. Fentanilo
- B. Tramadol
- C. Buprenorfina
- D. Oxycodona

Que síntomas relaciona con la sobredosis de morfina:

- A. Miosis
- B. Piel roja
- C. Hipotensión
- D. Alcalosis respiratoria