

TEMA 16
COADYUVANTES EN LA TERAPÉUTICA ANALGÉSICA

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL DOLOR

NOCICEPTIVO

- Estímulo nociceptores
- Sensación variable
- Desaparece con la noxa
- Alodinia poco frecuente
- Misión protectora
- Respuesta parcial a AINEs
- Respuesta buena opioides
- Respuesta parcial ADs y ACs

NEUROPÁTICO

- Lesión en vía nerviosa
- Sensación lancinante, quemazón
- Persiste tras la noxa
- Alodinia frecuente
- Sin finalidad
- Respuesta baja a AINEs
- Respuesta baja a opioides
- Respuesta buena ADs y ACs

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

AINEs

- Efecto analgésico moderado
- Frecuentes efectos adversos especialmente digestivos (menores con ICox-2)

MÉDULA

Opioides

- Efecto analgésico ilimitado
- Náuseas, estreñimiento, tolerancia

NOCICEPTOR

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

Antidepresivos

- Más empleado amitriptilina
- Frecuentes efectos anticolinérgicos y sedación
- Amitriptilina (tryptizol®)
- Tabl 10,25,50,75 mg. 1 comp 10 mg/24h (noche)
- Tricíclico, efecto analgésico y sedante.
- Anticolinérgico, arritmógeno, hipotensión ortostática.
- Útiles en neuropatías de cualquier tipo (NPH, diabética, cancerosa, facial), depresión por cáncer y dolor central

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

Benzodiazepinas

- Útil como sedante y relajante muscular
- Buena tolerancia y posibilidad de dependencia psíquica
- Lormetazepam (Noctamid ®) comp 1 mg (1 comp/noche)
- Cloracepato (Tranxilium ®) caps (5-50 mg)
inyec (20-100) (20-50 mg/ noche)

NOCICEPTOR

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

Anticonvulsivantes

- Más utilizados carbamazepina y gabapentina
- Frecuentes interacciones
- Carbamazepina (tegretol ®) comp 200,400 mg (100-200 mg/8h)
 - útil dolor punzante (trigémico)
 - nistagmus, diplopia, somnolencia, aplasia, lupus, erupción cutánea
- Gabapentina (neurontin ®) comp 100-400 mg (900-1200 mg/día)

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

Neurolépticos

- Efecto positivo en dolor neuropático
- Importantes efectos adversos
- Levopromazina (sinogan ®) comp 25, gotas 1gota=1mg
 - 10 gotas/24h (noche), 50 gotas/24h
 - bloqueo alfa, anticolinérgico, extrapiramidalismo
- haloperidol (haloperidol®) comp 10 mg, gotas 1 ml=2mg
 - 10-20 gotas/8h, 50 gotas/8h
 - idem que levopromazina. Mas incisivo

FÁRMACOS EN DOLOR CRÓNICO

Corticoides

- Administrados por vía epidural y sistémica
- Frecuentes efectos adversos
- Prednisolona (dacortin®) comp 2.5,5,30 mg
 - 1 comp 30 mg /24h
- metilprednisolona (urbason®) inyec 8,20,40,80, 500, 1000 mg
 - 1 mg/kg/día