

AUTOEVALUACIÓN TEMA 2

Un paciente con un proceso sistémico grave que limita su actividad, pero no es incapacitante pertenece a la Clase de ASA

- A. Clase 1
- B. Clase 2
- C. Clase 3
- D. Clase 4

Cual de estos son predictores mayores de riesgo cardiovascular aumentado

- A. IAM reciente (> 7 días y < 1 mes) o angor inestable
- B. ICC descompensada
- C. Angor estable
- D. Diabetes Mellitas

Cual de estos son predictores menores de riesgo cardiovascular aumentado

- A. ICC antigua o compensada
- B. Edad > 70 años
- C. ECG patológico (HVI, BRI, alteraciones ST)
- D. Ritmo no sinusal

Cual de estos medicamentos se debe retirar antes de la anestesia

- A. IMAOs
- B. Antiarrítmicos
- C. Betabloqueantes
- D. Acenocumarol (sintrom)

Cual de estas afirmaciones no son ciertas

- A. Se recomienda realizar siempre pruebas de alergia en los pacientes que van a ser anestesiados
- B. El ayuno ha ser al menos de 8 h
- C. Se recomienda practicar prueba de embarazo en mujeres fértiles
- D. La determinación de Hgb/Hct se recomienda solo en antecedentes de anemia

Con cual de estas cifras no se recomienda realizar cirugía electiva (programada)

- A. Htc > 30 %
- B. Hgb > 10 g/dL
- C. TP < 70 %
- D. plaquetas $< 50.000/mm^3$

Con cual de estas cifras se considera paciente de alto riesgo:

- A. PaO₂ > 60 mm Hg
- B. PCO₂ < 50 mm Hg
- C. FVC + FEV1 (expresados como % del valor normal o 100%) < 100
- D. Plaquetas > 100.000

Señale que factores son de riesgo de broncoaspiración

- A. Tratamiento con ranitidina
- B. obesidad mórbida
- C. gestación
- D. hernia de hiato